

令和4年度国分寺市風しん抗体検査・予防接種実施医療機関一覧（町名順）

医療機関名	所在地	電話番号 (☎042)	抗体検査	予防接種
福沢内科	北町5-7-2	324-7119	○	○
山口医院	戸倉2-11-55	322-0121	○	○
行野医院	戸倉2-26-16	572-4416	○	○
マシュマロこどもクリニック	戸倉4-45-5	320-1155	○	○
伊佐治内科	戸倉4-45-5	300-1347	○	○
さくら医院	本多1-3-15	320-5377	○	○
のむらクリニックスクエア	本多1-8-3	325-0087	○	○
小森こどもクリニック	本多2-3-3 国分寺市商工会館4階	322-5585	○	○
くろさわ子ども&内科クリニック	本多3-7-25	323-9630	○	○
小林内科医院	本町1-7-3 国分寺クリニックヴィレッジ2階	300-2072	○	○
国分寺内科クリニック	本町2-2-1 cocobunji EAST2階	322-1071	○	○
ひまわり皮膚科	本町2-9-12 オリエント丹野2階	326-1155	○	○
中島内科クリニック	本町3-13-1	327-3888	○	○
国分寺ウーマンズクリニック	本町4-1-9 国分寺本町クリスタルビル5階	325-4124	○	○
国分寺診療所	本町4-12-14	325-0766	○	○
なおはら内科・循環器科クリニック	西恋ヶ窪2-2-1 ビーンズアネックス西国分寺3階	328-7100	○	○
芦谷医院	西恋ヶ窪2-17-14 1階	321-3678	○	○
西国分寺クリニック	西恋ヶ窪3-24-3 小泉ビル1階	326-7011	○	○
加藤内科クリニック	西恋ヶ窪4-16-11	321-2110	○	○
にしおクリニック	西恋ヶ窪4-30-3 恋ヶ窪クリニックビル2階	320-5580	○	○
国分寺病院	東恋ヶ窪4-2-2	322-0123	○	○
ケン小児科内科クリニック	東恋ヶ窪5-14-1 アメニティ97 1階	320-5045	○	○
恋ヶ窪内科クリニック	東恋ヶ窪5-16-5 ヘルフラワー恋ヶ窪1階	312-2150	○	○
高橋内科クリニック	東恋ヶ窪6-2-6 チサカ第1ビル1階	322-7676	○	○
波多野クリニック	南町2-1-36 国分寺曽我ビル2階	324-2757	○	○
ひらまつ内科	南町2-17-5 恵ビル1階	301-1111	○	○
あさひ国分寺内科	南町3-1-29	322-4130	○	○
くまさんこどもクリニック	南町3-22-27 第2浜仲ビル1階	312-4358	○	○
国分寺内科中央病院	東元町2-3-19	322-0131	○	○
知念医院	東元町3-31-8	321-1076	○	○
東元町内科クリニック	東元町4-14-1 東元町メディカルビル3階	324-5688	○	○
武蔵国分寺公園クリニック	西元町2-16-34 ザ・ライオンズ武蔵国分寺公園127	320-4970	○	○
さつきクリニック	西元町2-17-14	359-4197	○	○
国分寺市医師会公衆衛生センター	泉町2-3-8 いずみプラザ2階 8月及び祝日を除く、火・木曜日に実施 (受付時間：午後1時～2時)	324-0238	○	○
やながわ内科クリニック	泉町2-9-3 泉ビル3階	320-5055	○	○
西国分寺レディースクリニック	泉町2-9-3 ハートフルビル西晴2階	300-0055	○	○
奥山内科クリニック	～R4.10月（予定）：泉町3-7-14コーポラン103号室 R4.11月～（予定）：泉町3-13-8	321-1115	○	○
山崎内科小児科	富士本2-1-28	573-1181	○	○
国分寺ひかり診療所	光町3-13-34	573-4011	○	○

※予約が必要となる場合がありますので、あらかじめ医療機関にご相談ください。

【予防接種を受けることができない方】

①発熱している（通常37.5℃以上）②重篤な急性疾患にかかっている。③麻しん風しん混合ワクチンの成分によってアナフィラキシー（通常接種後30分以内に出現する呼吸困難や全身性のじんましんなどを伴う重いアレルギー反応）をおこしたことがある。④そのほか、医師が不適当と判断した場合

【予防接種を受ける際に医師と相談が必要な方】

①心臓血管系・腎臓・肝臓・血液疾患等の基礎疾患がある。②過去の予防接種で接種後2日以内に発熱、じんましんなどのアレルギーを疑う症状がみられた。③過去にけいれん（ひきつけ）を起こしたことがある。④過去に免疫状態の異常を指摘されたことがある。または、近親者に先天性免疫不全症の方がいる。⑤麻しん風しん混合ワクチンの成分に対してアレルギーをおこすおそれがある。

【予防接種を受けた後の一般的な注意事項】

①接種後30分程度は体調の変化がないか様子を見て、すぐに医師と連絡がとれるようにしてください。②接種後1週間は副反応の出現に注意しましょう。③接種部分は清潔に保ちましょう。入浴はさしつかえありませんが、接種部位をこすことはやめましょう。④接種当日の激しい運動や多量の飲酒は避けましょう。⑤接種後、接種部位の異常な反応や体調の変化があった場合は、速やかに医師の診察を受けましょう。